



## Influencia de la asistencia a guarderías en la frecuentación en Urgencias y Atención Primaria

M.<sup>a</sup> Ángeles Ordóñez Alonso<sup>a</sup>, Begoña Domínguez Aurrecochea<sup>b</sup>, José I. Pérez Candás<sup>c</sup>, Purificación López Vilar<sup>d</sup>, María Fernández Francés<sup>a</sup>, Mar Coto Fuente<sup>e</sup>, Aidé Aladro Antuña<sup>f</sup>, Francisco J. Fernández López<sup>g</sup>

Publicado en Internet:  
15-septiembre-2016

María Ángeles Ordóñez Alonso:  
marigelo@hotmail.com

<sup>a</sup>Pediatra. CS de La Corredoria. Oviedo. Asturias. España • <sup>b</sup>Pediatra de Atención Primaria. Oviedo. Asturias. España • <sup>c</sup>Pediatra. CS de Sabugo. Avilés. Asturias. España • <sup>d</sup>Pediatra. CS Puerta de la Villa. Gijón. Asturias. España • <sup>e</sup>Pediatra. CS de la Magdalena. Avilés. Asturias. España • <sup>f</sup>Pediatra. CS de Otero. Oviedo, Asturias. España • <sup>g</sup>Pediatra. CS de Nava. Nava, Asturias. España.

### Resumen

**Introducción:** las guarderías surgen para atender una necesidad social, pero no están exentas de influir sobre la salud infantil.

**Pacientes y métodos:** estudio longitudinal prospectivo de dos cohortes de niños entre 0 y 24 meses (se diferencian en asistencia o no a guardería) que acuden a las consultas de 33 pediatras del Servicio Público de Salud del Principado de Asturias. Los datos se obtuvieron de la historia clínica informatizada y entrevistas programadas (6, 12, 18 y 24 meses). Se compararon: número medio de visitas a Servicios de Urgencias y Pediatría e influencia de diferentes variables recogidas. Se analizaron: la morbilidad registrada (infecciones agudas y sibilancias recurrentes) entre hiperfrecuentadores (HF) y no HF.

**Resultados:** el número medio de visitas a las consultas pediátricas es significativamente mayor para los niños que acuden a guardería en todos los tramos de edad estudiados. Hay mayor porcentaje de HF entre los que acuden a guardería: los niños de entre 0 y 6 meses que acuden tienen un riesgo relativo de ser HF a Servicios de Urgencias de hasta seis veces mayor que los que no acuden y cuatro veces mayor de ser HF en las consultas de Pediatría.

**Conclusiones:** 1) la asistencia a guardería se asocia con mayor probabilidad de ser HF en Urgencias y en la consulta de Pediatría de Atención Primaria (AP); 2) los niños HF padecen más enfermedades respiratorias e infecciosas, que no son explicadas por su asistencia a guardería, y 3) lo anterior conlleva un mayor consumo de fármacos.

### Palabras clave:

- Pediatría
- Utilización de recursos sanitarios
- Atención Primaria
- Morbilidad
- Escuelas infantiles

### Abstract

**Introduction:** nurseries arise to attend a social need, but are not without influence on children's health.

**Patients and methods:** prospective longitudinal study of two cohorts of children aged 0-24 months (they differ in nursery assistance or not) who come to the consultations of 33 pediatricians at the Public Health Service of Asturias. The data were obtained from the clinical history and interviews scheduled (6, 12, 18 and 24 months). They were compared: average number of visits to Emergency and Paediatrics Services, and influence of different variables collected. We analyzed: the registered morbidity (acute infections and recurrent wheezing) between frequent attenders (HF) and not HF.

**Results:** the average number of visits to pediatric consultations is significantly higher for children attending nurseries in all age groups studied. There is a higher percentage of HF among those attending nursery: children between 0 and 6 months that have a relative risk of HF to Emergency Services up to 6 times higher than those not attending and four times higher of being HF in consultations of a Primary Care center.

**Conclusions:** 1) attendance at kindergarten is associated with increased probability of being HF in Emergency departments and Paediatrics Primary Care services; 2) the HF children suffer more respiratory and infectious diseases, which are not explained by their attendance at a nursery, y 3) the above carries a higher drug consumption.

### Key words:

- Pediatrics
- Medical overuse
- Primary health care
- Morbidity
- Child day care centers

## Influence of nursery attendance in Emergency and Primary Care frequentation

**Cómo citar este artículo:** Ordóñez Alonso MA, Domínguez Aurrecochea B, Pérez Candás JI, López Vilar P, Fernández Francés M, Coto Fuente M, et al. Influencia de la asistencia a guarderías en la frecuentación en Urgencias y Atención Primaria. Rev Pediatr Aten Primaria. 2016;18:243-52.

## INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1956 las escuelas infantiles o guarderías como: “Instituciones para el cuidado de los niños sanos, que no pueden ser atendidos en el hogar durante una parte considerable del día. Su principal objetivo sería completar adecuadamente los cuidados que el niño recibe en el medio familiar”<sup>1</sup>.

En nuestro país, según las encuestas de población del año 2010, el 25,01% de las mujeres trabajan fuera del hogar y utilizan servicios especializados para el cuidado de sus hijos<sup>2</sup>.

La estancia en guarderías no está exenta de influir sobre la salud del niño<sup>3,4</sup>, conllevando un significativo aumento de infecciones agudas en la infancia. Un mayor número de procesos agudos lleva implícito un mayor consumo de recursos sanitarios y de medicamentos. Thrane *et al.*<sup>5</sup> demostraron que el riesgo de recibir tratamiento antibiótico se duplica durante los tres primeros meses de asistencia a la guardería.

La mayor incidencia de enfermedades infecciosas también afecta a la sociedad, con transmisión de las mismas al entorno familiar inmediato<sup>6,7</sup>.

De todo lo anterior se puede derivar un aumento del uso de los servicios sanitarios, ya de por sí elevada en la población menor de cinco años<sup>8</sup>, y, teniendo en cuenta estudios que vinculan el uso de la atención sanitaria en el pasado como mejor predictor del uso de la misma en el futuro<sup>9</sup>, podríamos encontrar que ciertos perfiles inadecuados de utilización podrían instaurarse en la infancia y mantenerse en la edad adulta.

Estamos, por tanto, ante una realidad que influye de forma decisiva en la salud diaria de los niños y en el gasto sanitario presente y futuro (pudiendo causar un incremento del riesgo de daño iatrogénico en el niño y una tensión en el sistema de salud pública con consumo de los recursos del mismo).

El objetivo del presente estudio será analizar cómo influyen las guarderías en la demanda de servicios médicos y en la aparición de patrones de hiperfrecuentación (HF). Además, se pretende estudiar el

patrón de morbilidad (patología infecciosa aguda y sibilancias recurrentes) de los niños HF.

## OBJETIVOS

- Definir estadísticamente patrones de HF, tanto en los servicios de urgencias como en las consultas de Pediatría de Atención Primaria (PAP).
- Establecer la influencia de factores analizados en la HF:
  - Relacionados con el niño: sexo, edad gestacional, peso de recién nacido, patología neonatal y calendario vacunal.
  - Relacionados con la alimentación: lactancia materna y su duración.
- Relacionados con factores familiares y socioeconómicos: número de hermanos, y respecto al padre y madre la edad, el nivel de estudios y ocupación laboral.
- Valorar si el factor “exposición a la guardería” modifica el comportamiento previo respecto al uso de los servicios sanitarios y favorece patrones de uso excesivo de los servicios sanitarios.
- Conocer si tras el perfil de HF existe un patrón de morbilidad diferente.

## POBLACIÓN Y MÉTODOS

Estudio longitudinal prospectivo de dos cohortes de niños de 0-24 meses, que se diferencian exclusivamente por la asistencia o no a la guardería (factor de exposición).

**Participantes:** inicialmente participaron 35 pediatras y 20 enfermeras pertenecientes a las ocho áreas sanitarias del Servicio Público de Salud del Principado de Asturias (SESPA) que incluyeron en el estudio a 1139 niños.

**Criterios de inclusión:** niños nacidos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre del 2010 que acuden regularmente a las consultas de PAP del SESPA, cuyas familias aceptaron participar tras recibir información completa. Criterios de exclusión: presencia de patología respiratoria, cardíaca e inmunodeficiencias graves.

## Variables del estudio

**Variable independiente:** la asistencia a guarderías, sí o no (cualitativa dicotómica), define las dos cohortes. Se registró la edad de inicio (en meses) y los motivos por los que acuden.

### Variables de caracterización:

- Características personales: código; fecha de nacimiento; sexo; edad gestacional, peso del recién nacido y presencia de patología neonatal; lactancia materna; calendario vacunal de Asturias y opcional (vacunas antineumocócica, contra el rotavirus y antivaricela).
- Características familiares: número de hermanos, y respecto al padre y la madre, edad, nivel de estudios, ocupación laboral sí o no, tabaquismo, alergias y asma.

### Variables dependientes:

- El número y tipo de infecciones agudas que generan consulta (a PAP o a Servicios de Urgencias): bacteriemia, bronquiolitis, bronquitis aguda, conjuntivitis, enfermedades víricas exantemáticas, faringitis, faringoamigdalitis, gastroenteritis aguda, gripe, laringitis, meningitis, neumonía, otitis media aguda, resfriado común, sepsis, episodios de sibilancias recurrentes, previamente definidas según el *Tratado de Pediatría Nelson*.
- Las visitas a Servicios de Urgencias y Pediatría: se incluyeron todas las visitas, aunque correspondieran a un mismo proceso patológico. Se excluyeron las visitas correspondientes al programa de salud infantil.
- Fármacos consumidos: antibióticos, broncodilatadores, corticoides inhalados y orales y montelukast.

## Recogida de los datos

Los datos se obtuvieron de la historia clínica informatizada y de entrevistas programadas a los padres en las consultas de PAP a la edad de 6, 12, 18 y 24 meses. Las variables de caracterización se recogieron en la primera visita y las variables de respuesta a los 6, 12, 18 y 24 meses, registrándose en

formularios previamente diseñados. El consentimiento informado a los padres incluye una afirmación explícita de acatamiento y cumplimiento de la normativa legal y los aspectos éticos.

## Análisis estadístico

Se ha realizado un análisis descriptivo proporcionando la distribución de frecuencias para variables cualitativas y medidas como la media, mediana y desviación típica (DE) en el caso de variables cuantitativas. El test  $\chi^2$  de Pearson fue utilizado para el análisis de dos variables cualitativas, calculando el riesgo relativo e intervalo de confianza del 95% (IC 95) cuando la relación resultó estadísticamente significativa ( $p < 0,05$ ). Para la comparación de dos promedios se utilizó el test t de Student o el test de Welch, y para más de dos, el test de Kruskal-Wallis. Las hipótesis de normalidad e igualdad de varianzas fueron contrastadas mediante el test de Shapiro-Wilk y el test de Ansary-Bradley respectivamente. Para este análisis se utilizó el programa estadístico R®, versión 2.15 (R Development Core Team, 2012).

## RESULTADOS

Se recogieron datos de 1139 niños a los seis meses, de 1092 a los 12 meses y finalmente de 975 niños a los 24 meses. La pérdida del 14,3% fue debida al cambio de trabajo de tres pediatras (7,9%) y al cambio de domicilio de niños incluidos (7,4%).

Homogeneidad de las cohortes estudiadas: ambas cohortes son homogéneas, excepto para el nivel de estudios de los padres y el empleo materno (la cohorte que acude a la guardería presenta mayor porcentaje de estudios universitarios y trabajo materno fuera del hogar).

La cobertura vacunal frente a neumococo y rotavirus es mayor en niños que acuden a guarderías.

Niños que acuden a la guardería: a los dos años acuden a la guardería el 43,7% de los niños incluidos en el estudio (la mayor incorporación es entre cinco y seis meses). En el 90,7% de casos el trabajo de los padres es la causa del inicio a guardería.

### Comportamiento de los dos grupos respecto al número medio de visitas al mes a los servicios de urgencias o de PAP (Tabla 1):

- El número de visitas mensuales de los niños que no acuden a guarderías es menor ( $p < 0,05$ ), en comparación con los que sí acuden, independientemente de la edad de inicio de la misma. Hay que tener en cuenta que en nuestro estudio solo se evaluaron las consultas por procesos infecciosos o por sibilancias recurrentes.
- Para conocer si la variable “asistencia a guardería” modificaba el comportamiento del uso de los servicios sanitarios, se analizó por tramos de edad si la incorporación a ella influía en el número medio de visitas médicas mensuales, observándose diferencias significativas en todos los casos (Tabla 2).

#### Definición de hiperfrecuentadores:

Consideramos HF a niños con media de más de dos desviaciones estándar (DE) para el total de las visitas realizadas durante los dos años del estudio. HF del Servicio de Urgencias: la media de visitas en los

dos primeros años de vida es 2,69 y DE 2,99 (Tabla 3). Por tanto, para ser HF, han de tener más de 8,67 visitas en los dos primeros años de vida (5,03% del total de niños estudiados) (Tabla 4).

HF de la consulta de Pediatría: la media de visitas en los dos primeros años de vida es 14,56 y la DE 10,08 (Tabla 3). Los HF han de tener más de 34,72 visitas en los dos primeros años de vida (4,10% del total de niños del estudio) (Tabla 4).

En ambos casos, los que acuden a edades más tempranas (entre 0 y 6 meses) presentan mayores porcentajes de HF (Tabla 5) y tienen un riesgo relativo (RR) de ser HF de los Servicios de Urgencias de hasta seis veces mayor que los que no acuden y un RR cuatro veces mayor de ser HF de las consultas de Pediatría.

#### Análisis de la morbilidad de los niños hiperfrecuentadores en relación al número de episodios padecidos

Analizando el número medio de episodios infecciosos que tienen los HF, frente a los no HF, mayoritariamente los primeros no solo acuden a los ser-

**Tabla 1.** Número medio de visitas/mes al Servicio de Urgencias y Pediatría de Atención Primaria (PAP)

Número medio visitas/mes	No guardería	Inicio menos de 6 meses	Inicio entre 6 y 11 meses	Inicio entre 12 y 17 meses	Inicio más de 18 meses	P valor K-W
Urgencias	0,09	0,19	0,14	0,12	0,13	0
PAP	0,53	0,74	0,75	0,69	0,67	0

**Tabla 2.** Número medio de visitas a Urgencias y al pediatra de Atención Primaria antes y después de inicio guardería para los diferentes tramos de edad

	Número medio visitas/mes en urgencias			Número medio visitas/mes en el pediatra de Atención Primaria		
	Antes inicio guardería	Después inicio guardería	p	Antes inicio guardería	Después inicio guardería	p
Entre 6 y 11 meses	0,09	0,16	0,000	0,27	1,24	0,000
Entre 12 y 17 meses	0,09	0,15	0,000	0,55	0,83	0,000
Entre 18 y 24 meses	0,03	0,49	0,000	0,57	0,96	0,000

**Tabla 3.** Definición de hiperfrecuentación del Servicio de Urgencias y pediatra de Atención Primaria

	Servicio de Urgencias	Pediatra de Atención Primaria
Media de visitas/año	2,69	14,56
Desviación estándar	2,99	10,08
Definición de HF (según las vistas para el total de los 2 años)	> 8,67	> 34,72

HF: hiperfrecuentación.

**Tabla 4. Hiperfrecuentadores del Servicio de Urgencias y pediatra de Atención Primaria en número y porcentaje si acuden o no a guardería, según edad de inicio**

	HP en Urgencias		HP en PAP	
	Número	%	Número	%
No guardería	15	2,73%	14	2,55%
Entre 0 y 6 meses	12	16,67%	8	11,11%
Entre 6 y 11 meses	6	5,50%	6	5,50%
Entre 12 y 17 meses	8	5,88%	8	5,88%
Entre 18 y 24 meses	8	7,34%	4	3,67%
Total	49	5,03%	40	4,10%

HP: hiperfrecuentadores; PAP: Pediatría de Atención Primaria.

**Tabla 5. Riesgo relativo de ser hiperfrecuentadores si asisten a guardería según tramos de edad**

	HF en Urgencias RR (IC 95)	HF en PAP RR (IC 95)
No guardería	Categoría referencia	Categoría referencia
Inicio entre 0 y 6 meses	6,1 (2,97-12,51)	4,36 (1,89-10,02)
Inicio entre 7 y 12 meses	2,01 (0,79-5,08)	2,16 (0,85-5,49)
Inicio entre 13 y 18 meses	2,15 (0,93-4,97)	2,31 (0,98-5,38)
Inicio a partir de 18 meses	2,69 (1,17-6,18)	1,44 (0,48-4,29)

HF: hiperfrecuentadores; IC 95: intervalo de confianza del 95%; PAP: Pediatría de Atención Primaria; RR: riesgo relativo.

vicios médicos más veces, sino que también padecen mayor número medio de episodios de las patologías de mayor prevalencia estudiadas (bronquiolitis, bronquitis, conjuntivitis, gastroenteritis, otitis media, resfriado común, sibilancias recurrentes y sinusitis) (Tabla 6).

Cuando analizamos la morbilidad de los hiperfrecuentadores, observamos que el factor “acudir a guardería” no determina diferencias estadísticamente significativas (Tabla 7).

**Tabla 6. Número medio de episodios de las diferentes patologías para hiperfrecuentadores (HF) y no HF de los Servicios de Urgencias y consultas de Pediatría de Atención Primaria**

	Urgencias			PAP		
	HF	No HF	p	HF	No HF	p
Bronquiolitis	0,73	0,4	0	0,82	0,4	0,01
Bronquitis	1,18	0,6	0,01	1,6	0,59	0
Conjuntivitis	1,1	0,61	0,01	1,85	0,58	0
Enfermedades víricas exantemáticas	0,71	0,46	0,06	0,72	0,46	0,09
Faringitis vírica	0,88	0,51	0,03	0,95	0,51	0,02
Faringoamigdalitis	0,41	0,25	0,23	0,32	0,25	0,47
Gastroenteritis	1,37	0,79	0,02	1,75	0,78	0
Gripe	0,33	0,11	0,04	0,2	0,11	0,26
Laringitis	0,65	0,34	0,06	0,55	0,35	0,16
Neumonía	0,14	0,06	0,15	0,1	0,06	0,42
Otitis media	1,51	0,68	0,01	2,08	0,67	0
Resfriado común	7,31	3,66	0	8,47	3,65	0
Sibilancias recurrentes	1,59	0,36	0	1,8	0,36	0
Sinusitis	0,14	0,21	0,35	1,12	0,16	0,04
Viriasis	0,29	0,07	0,01	0,17	0,07	0,32

HF: hiperfrecuentadores; PAP: Pediatría de Atención Primaria.

**Tabla 7. Número medio de episodios de las diferentes patologías para hiperfrecuentadores de Urgencias y consultas de Atención Primaria, según asistencia o no a guarderías**

	HP en Urgencias			HP en PAP		
	Asiste guardería	No asiste guardería	p	Asiste guardería	No asiste guardería	p
Bronquiolitis	0,74	0,71	0,87	0,86	0,75	0,97
Bronquitis	1,17	1,21	0,97	1,39	2,08	0,15
Conjuntivitis	1,37	0,43	0,02	1,89	1,75	0,89
Viriasis exantemáticas	0,71	0,71	0,99	0,71	0,75	0,91
Faringitis vírica	0,97	0,64	0,26	0,93	1	0,6
Faringoamigdalitis	0,43	0,36	0,86	0,33	0,32	0,99
Gastroenteritis	1,46	1,14	0,94	1,38	1,92	0,47
Gripe	0,26	0,5	0,72	0,21	0,17	0,41
Laringitis	0,8	0,29	0,22	0,54	0,58	0,46
Neumonía	0,14	0,14	0,99	0,11	0,08	0,84
Otitis media	1,97	0,36	0,01	2,39	1,33	0,06
Resfriado común	7,63	6,5	0,76	8,64	8,08	0,71
Sibilancias recurrentes	1,37	2,14	0,18	1,79	1,83	0,68
Sinusitis	0,11	0,21	0,74	1,11	1,17	0,23

HP: hiperfrecuentadores.

### Estudio del consumo de fármacos por parte de los hiperfrecuentadores

Entre los HF hay un mayor porcentaje de consumo de broncodilatadores orales e inhalados, corticoides orales e inhalados, montelukast y antibióticos ( $p < 0,05$ ) (Tabla 8).

### DISCUSIÓN

Es un estudio prospectivo multicéntrico diseñado por el grupo de investigación de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)<sup>10</sup> y adaptado para Asturias por la Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (AAPap): *Patología infecciosa y consumo de recursos sanitarios*

**Tabla 8. Comparación del consumo de fármacos entre hiperfrecuentadores y no hiperfrecuentadores**

	Urgencias			Pediatría de Atención Primaria		
	No HF	HF	p	No HF	HF	p
Número medio de consumo de ciclos de antibióticos	2,1	4,69	< 0,01	2,1	5,35	< 0,01
% casos con consumo de corticoides orales a lo largo de los 24 meses	31,10%	61,22%	< 0,01	31,12%	67,50%	< 0,01
Número medio de ciclos de corticoides orales en los 24 meses	0,52	1,53	< 0,01	0,52	1,91	< 0,01
% casos con consumo de corticoides inhalados a lo largo de los 24 meses	11,23%	24,49%	0,01	10,80%	37,50%	< 0,01
% casos con consumo de broncodilatadores orales en los 24 meses	31,97%	46,94%	0,04	31,12%	70,00%	< 0,01
% casos con consumo de broncodilatadores inhalados a lo largo de los 24 meses	29,16%	63,27%	< 0,01	29,20%	70,00%	< 0,01
% casos con consumo de montelukast a lo largo de los 24 meses	8,86%	22,45%	< 0,01	8,86%	22,45%	< 0,01

HP: hiperfrecuentadores.

en menores de dos años que acuden a guarderías<sup>11</sup>. Su ámbito de estudio son las consultas de PAP del servicio público de salud a las que acude habitualmente entre el 90 y el 95% de los niños<sup>12</sup>.

El trabajo lo realizaron de manera voluntaria 33 pediatras y 20 enfermeras, lo que sin duda mejora el registro, aunque no permite aleatorizar la muestra. La coordinación del trabajo se ha realizado por el grupo de investigación que recogió y revisó las encuestas antes de enviarlas al equipo estadístico. Los datos se han recogido durante las consultas habituales, intentando optimizar la capacidad investigadora de la PAP.

El importante número de pediatras participantes permite obtener una amplia muestra, pero incorpora limitaciones, siendo la más importante la posible falta de homogeneidad en los criterios diagnósticos; se intentó minimizar con definiciones previas de las patologías registradas.

Otra de las limitaciones del estudio es que solo se tuvieron en cuenta las visitas por procesos infecciosos o por episodios de sibilancias recurrentes, una patología potencialmente grave, de elevada prevalencia en Asturias (el 45,6% de los niños presentan algún episodio de sibilancias en los 36 primeros meses de vida)<sup>13</sup>.

Cada episodio motivo de consulta que originó un diagnóstico determinado se registró en una sola ocasión, aunque por el mismo proceso el niño acudiera más de una vez a los servicios sanitarios.

El número de visitas tanto a las consultas de Pediatría como a los Servicios de Urgencias se registró todas las veces que consultaron los niños, aunque lo hicieran por un mismo episodio.

No se tuvieron en cuenta características de las guarderías ni tiempo de permanencia en ella, pero Lafuente *et al.*<sup>14</sup>, en un estudio de características similares, no encontraron diferencias en las patologías según las horas de estancia en las guarderías ni el número de niños por cuidador de las mismas. Aunque la muestra inicial fue de 1139 niños, la muestra definitiva fue de 975 niños (73% del total de niños nacidos en el tiempo y ámbito del estudio).

Acuden a la guardería el 43,7% de la población estudiada, cifra cercana a la publicada en "Estadística de las enseñanzas no universitarias con 51,8 % de niños escolarizados a los dos años"<sup>15</sup>.

El promedio de visitas mensuales a los Servicios de Pediatría (Urgencias y PAP) es mayor para los niños que acuden a la guardería y aumenta de manera significativa si la incorporación a la misma es temprana. Esto mismo fue observado en estudios realizados en otras comunidades autónomas<sup>15,16</sup>.

Se desplaza la aparición de los primeros episodios de enfermedades infecciosas a una edad más temprana, donde las complicaciones que requieren atención médica son más probables<sup>17</sup>.

En nuestro estudio, el número medio de visitas a los Servicios de Urgencias o de PAP por tramos de edad (de 7 a 11 meses, de 12 a 18 y mayores de 18 meses) se ve incrementado tras el inicio de la guardería ( $p=0,000$  en todas las categorías). Hay que tener en cuenta que el grupo de menores de seis meses no podemos evaluarlo por no tener datos previos a la incorporación a la guardería.

La hiperfrecuentación en edades pediátricas es algo conocido, pero escasamente estudiado.

Definir el número de consultas requerido para que un paciente sea considerado como hiperfrecuentador (HF) es problemático y sin un criterio uniforme en la bibliografía médica consultada.

El Instituto Croata de la Salud<sup>18</sup> considera a los niños HF si el número de visitas está en el último cuartil de frecuencia de consulta (más de diez consultas anuales por niño). Melissa Klein *et al.*, en 2011 pusieron el corte en más de dos DE (nueve o más visitas en un año)<sup>19</sup>. Habida cuenta que dichos estudios han sido realizados en otros países y que el estilo de la utilización de los servicios de salud puede verse influenciada por factores diversos (personales de los pacientes, factores sociales [sociodemográficos], factores familiares o apoyo social, y los factores relacionados de manera específica con el sistema de salud [atención pediátrica frente a medicina general en el primer nivel asistencial, la disponibilidad y la accesibilidad]) sus resultados nos pueden servir de orientación, pero no de comparación.

Estudios realizados en nuestro país encuentran una HF de 14,89% usando la definición como la media +1 DE, pero el rango de edades estudiadas fue de 0 a 14 años y una duración del estudio de tres meses<sup>20</sup>. Usando la misma definición otro estudio en AP en 2012, con un seguimiento de 12 meses, encuentra que en el grupo de menores de un año serían HF los que tienen más de nueve visitas al año y en el de uno a dos años serían los de más de 12 visitas. La tasa global de HF sería de 11,86%<sup>21</sup>. Tienen en cuenta todas las consultas a demanda y el número de participantes es notablemente inferior al nuestro.

En nuestro estudio, que diferencia visitas a Urgencias de visitas a consulta del PAP, los resultados están referenciados a los dos años de seguimiento, siendo HF a Pediatría los que superan más de 34,72 visitas al cabo de los dos años.

De todos los factores analizados solo hemos encontrado relación entre HF y asistencia a guardería, sobre todo en incorporaciones antes de los seis meses (teniendo un RR de ser HF de 6 y 4,36 para Urgencias y consulta de Pediatría, respectivamente). Existen trabajos que corroboran esta relación<sup>17</sup>. Todo lo anterior origina un aumento del consumo de recursos sanitarios de los niños cuidados en guarderías, no solo por las jornadas de trabajo anuales perdidas por los padres<sup>22</sup> sino por el mayor consumo farmacológico en antibióticos<sup>13,23,24</sup>, incluso llegando a recibir tratamiento con ellos en el 80% de las consultas de niños hasta 12 meses<sup>25</sup>.

Nosotros encontramos que el RR de consumir fármacos (antibióticos, broncodilatadores orales e inhalados, corticoides orales e inhalados y montelukast) es mayor para los niños que inician tempranamente la guardería. Si analizamos específicamente a los niños HF (independientemente de su asistencia no a guardería) vemos que tienen mayores consumos en todos ellos ( $p < 0,05$ ).

El término hiperfrecuentador tiene habitualmente una significación peyorativa y hemos pretendido también conocer si los quizá mal llamados así puedan ser una subpoblación de nuestros niños con un perfil “inmunológico de riesgo” (factor predisponente), en

los que este sistema de cuidados (asistencia a guardería) actúa como factor precipitante, dado que la asistencia a guardería produce un incremento de la incidencia de estas enfermedades, además de sibilancias recurrentes.

Aunque el número total de hiperfrecuentadores de nuestro estudio es pequeño, ya que este trabajo no fue diseñado inicialmente para este estudio, hemos analizado comparativamente el número y tipo de procesos infecciosos de los HF que van frente a los que no van a guardería, no encontrándose diferencias significativas. Por tanto, los HF independientemente del modo de cuidado (guardería frente a domicilio), son niños que padecen un número medio de episodios significativamente mayor de casi todas las patologías infecciosas analizadas, así como de sibilancias recurrentes. Esto quizá sea otro argumento que avala la hipótesis de niños con un particular perfil inmunológico.

## CONCLUSIONES

- La asistencia a guarderías se asocia con mayor probabilidad de ser HF (bien al Servicio de Urgencias o a la consulta de PAP).
- Los niños HF padecen más enfermedades respiratorias e infecciosas, que no son explicadas por su asistencia a guardería.
- Lo anterior probablemente lleva como consecuencia que tengan un mayor consumo farmacológico (antibióticos, broncodilatadores orales e inhalados, corticoides orales e inhalados y montelukast).
- La preponderancia de las enfermedades respiratorias e infecciosas en todos los grupos HF sugiere que estos podrían ser objeto de futuras investigaciones.

## CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.

El trabajo ha sido subvencionado por la Oficina de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias, con expediente



AP10-11, resolución de junio de 2010. No ha recibido ningún otro tipo de financiación.

## ABREVIATURAS

**AAPap:** Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria • **AEPap:** Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria • **AP:** Atención Primaria • **DE:** desviación estándar • **HF:** hiperfrecuentación • **IC 95:** intervalo de confianza del 95% • **OMS:** Organización Mundial de la Salud • **PAP:** Pediatría de Atención Primaria • **RR:** riesgo relativo • **SESPA:** Servicio Público de Salud del Principado de Asturias.

## AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen el apoyo recibido por parte de la Unidad de Consultoría Estadística de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo, y en especial el apoyo de Tania Iglesias Cabo.

**Grupo investigador MORBIGUARD:** Aide Aladro Antuna, Ana M. Pérez López, Begoña Domínguez Aurrecochea, Encarnación Díez Estrada, Francisco J. Fernández López, José I. Pérez

Candas, Leonor Merino Ramos, María Fernández Francés, M.ª Ángeles Ordóñez Alonso, Purificación López Vilar, Sonia Ballesteros García, Mar Coto Fuente. **Grupo colaborador:** Isabel González-Posada Gómez, Sonia Alonso Álvarez, M.ª Agustina Alonso Álvarez, Diana Solís, Josefina Collao Alonso, Margot Morán Gutiérrez, Ángel Costales-Gloria Peláez, Mónica Cudeiro Álvarez, Beatriz Fernández López, M.ª Pilar Flórez Rodríguez, Cruz Andrés Álvarez, Isolina Patallo Arias, Mónica Fernández Inestal, Ana Pérez Vaquero, Carmen Díaz Fernández, Silvia Ruisánchez Díez, Antonia Sordo, M.ª Antonia Castillo, Lidia González Guerra, Águeda García Merino, Teresa García, M.ª Teresa Canon del Cueto, Laura Tascón Delgado, Isabel Tamargo Fernández, Laura Lagunilla Herrero, Susana Concepción Polo Mellado, Cruz Bustamante Perlado, Susana Parrondo, Nevada Juanes Cuervo, Ana Arranz Velasco, Belén Aguirrezabalaga González, Mario Gutiérrez Fernández, Isabel Mora Gandarillas, Rosa M.ª Rodríguez Posada, Isabel Fernández Álvarez-Cascos, Isabel Carballo Castillo, Felipe González Rodríguez, Tatiana Álvarez González, Zoa Albina García Amorín, Monserrat Fernández Revilla, Fernando Nuno Martín.

## BIBLIOGRAFÍA

1. La asistencia al niño en las guarderías y residencias infantiles. Informe técnico n.º 256. En: Organización Mundial de la Salud [en línea] [consultado el 14/09/2016]. Disponible en <http://apps.who.int/iris/handle/10665/37485>
2. Encuesta de población activa. Módulo de conciliación entre la vida laboral y familiar. En: Instituto Nacional de Estadística [en línea] [consultado el 14/09/2016]. Disponible en [www.ine.es/prensa/np417.pdf](http://www.ine.es/prensa/np417.pdf)
3. Enserink R, Ypma R, Donker GA, Smit HA, Van Pelt W. Infectious disease burden related to child day care in the Netherlands. *Pediatr Infect Dis J*. 2013;32:e334-40.
4. Ochoa Sangrador C, Barajas Sánchez MV, Muñoz Martín B. Relación entre la asistencia a guarderías y enfermedades infecciosas agudas en la infancia. Una revisión sistemática. *Rev Esp Salud Pública*. 2007;81:113-29.
5. Thrane N, Olesen C, Md JT, Søndergaard C, Schønheyder HC, Sørensen HT. Influence of day care attendance on the use of systemic antibiotics in 0 to 2 years old children. *Pediatrics*. 2001;107:e76.
6. Marshall BC, Adler SP. The frequency of pregnancy and exposure to cytomegalovirus infections among women with a young child in day care. *Am J Obstet Gynecol*. 2009;200:163.e1-5.
7. Hedin K, Andre M, Mölsted S, Rodhe N, Petersson C. Infections in families with small children: use of social insurance and healthcare. *Scand J Prim Health Care*. 2006;24:98-103.
8. Oterino de la Fuente D, Peiró Moreno S. Utilización de los servicios de urgencias hospitalarios por niños menores de dos años. *An Pediatr (Barc)*. 2003;58:23-8.
9. Janicke DM., Finney JW, Riley AW. Children's health care use. A prospective investigation of factors related to care-seeking. *Med Care*. 2001;39:990-1001.
10. Del Castillo Aguas G, Gallego Iborra A, Ledesma Albarrán JM, Gutiérrez Olid M, Moreno Muñoz G, Sánchez Tallón R. Influencia de la asistencia a las guarderías sobre la morbilidad y el consumo de recursos sanitarios en niños menores de dos años. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2009;11:695-708.
11. Domínguez Aurrecochea B, Fernández Francés M, Ordóñez Alonso MA, López Vilar P, Pérez Candás JI, Merino Ramos L, et al. Patología infecciosa y consumo de recursos sanitarios en menores de 2 años que acuden a guarderías. *An Pediatr (Barc)*. 2015;83:149-59.

12. Actividad ordinaria en centros de Atención Primaria Informe resumen evolutivo del sistema nacional de salud 2007-2009. En: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad [en línea] [consultado el 14/09/2016]. Disponible en <http://goo.gl/iKebiP>
13. Cano Garcinuño A, Mora Gandarillas I, Grupo SLAM. Patrones de evolución temporal de las sibilancias en el lactante. *Bol Pediatr*. 2012;52:86-7.
14. Lafuente Mesanza P, Lizarraga Azparren MA, Ojembarrena Martínez E, Gorostiza Garay E, Hernaiz Barandiarán JR. Escolarización precoz e incidencia de enfermedades infecciosas en niños menores de 3 años. *An Pediatr (Barc)*. 2008;68:30-8.
15. Estadística de las enseñanzas no universitarias. Curso 2012-2013. En: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Estadística y Estudios [en línea] [consultado el 14/09/2016]. Disponible en <http://goo.gl/i3ioPx>
16. Gorrotxategi Gorrotxategi P, Aseguinolaza Iparraguirre I, Sarrionandia Uribelarrea MJ, di Michele Russo A, Reguilón Miguel MJ, Caracho Arbaiza MR, et al. La asistencia a la guardería aumenta no solo la morbilidad, sino también el uso de recursos sanitarios. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2013;15:177-9.
17. Enserink R, Ypma R, Donker G A, Smit HA, van Pelt W. Infectious disease burden related to child day care in the Netherlands. *Pediatr Infect Dis J*. 2013;32:e334-40.
18. Stojanović-Špehar S, Blažeković-Milaković S, Bergman-Marković B, Matijašević I. Preschool children as frequent attenders in Primary Health Care in Croatia: retrospective study. *Croat Med J*. 2007;48:852-9.
19. Klein M, Vaughn LM, Baker RC, Taylor T. Welcome back? Frequent attenders to a pediatric primary care center. *J Child Health Care*. 2011;15:175-86.
20. Tapia Collados C, Gil Guillén V, Orozco Beltrán D, Bernáldez Torralba C, Ortuño Adán E. Hiperfrecuentación en las consultas de Pediatría de Atención Primaria. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2004;6:547-57.
21. Parrilla Roure M, Palma Barrio RM, Bailón López RM, Fanego Fernández A, Santisteban Robles M. Hiperfrecuentación pediátrica en dos centros de salud urbanos. Comunicación oral. Congreso SEPEAP 2013. En: *Pediatría en Atención Primaria* [en línea] [consultado el 14/09/2016]. Disponible en <http://goo.gl/U0eQir>
22. Churchil R, Pickering L. Infection control challenges in child-care center. *Infect Dis Clin North Am*. 1997;2:347-63.
23. Nordlie AL, Andersen BM. Changes in antibiotic consumption among day-care children in Oslo. *Tidsskr Nor Laegeforen*. 2007;127:2924-6.
24. Thrane N, Olesen C, Søndergaard C, Schønheyder HC, Sørensen HT. Influence of day care attendance on the use of systemic antibiotics in 0- to 2-year-old children. *Pediatrics*. 2001;107:e76.
25. Nordlie AL, Andersen BM. Children in day care centers: infections and use of antibiotics. *Tidsskr Nor Laegeforen*. 2002;122:2707-10.



## Impact of day-care centre attendance on frequency of primary care and emergency department visits

M.<sup>a</sup> Ángeles Ordóñez Alonso<sup>a</sup>, Begoña Domínguez Aurrecochea<sup>b</sup>, José I. Pérez Candás<sup>c</sup>, Purificación López Vilar<sup>d</sup>, María Fernández Francés<sup>a</sup>, Mar Coto Fuente<sup>e</sup>, Aidé Aladro Antuña<sup>f</sup>, Francisco J. Fernández López<sup>g</sup>

Published online:  
15-september-2016

María Ángeles Ordóñez Alonso :  
marigelo@hotmail.com

<sup>a</sup>Pediatra. CS de La Corredoria. Oviedo. Asturias. España • <sup>b</sup>Pediatra de Atención Primaria. Oviedo. Asturias. España • <sup>c</sup>Pediatra. CS de Sabugo. Avilés. Asturias. España • <sup>d</sup>Pediatra. CS Puerta de la Villa. Gijón. Asturias. España • <sup>e</sup>Pediatra. CS de la Magdalena. Avilés. Asturias. España • <sup>f</sup>Pediatra. CS de Otero. Oviedo, Asturias. España • <sup>g</sup>Pediatra. CS de Nava. Nava, Asturias. España.

### Abstract

**Introduction:** nurseries arise to attend a social need, but are not without influence on children's health.

**Patients and methods:** prospective longitudinal study of two cohorts of children aged 0-24 months (they differ in nursery assistance or not) who come to the consultations of 33 pediatricians at the Public Health Service of Asturias. The data were obtained from the clinical history and interviews scheduled (6, 12, 18 and 24 months). They were compared: average number of visits to Emergency and Paediatrics Services, and influence of different variables collected. We analyzed: the registered morbidity (acute infections and recurrent wheezing) between frequent attenders (HF) and not HF.

**Results:** the average number of visits to pediatric visits is significantly higher for children attending kindergarten in all age groups studied. There is a higher percentage of HF among those attending nursery: children between 0 and 6 months that have a relative risk of HF to Emergency Services up to 6 times higher than those not attending and four times higher of being HF in consultations of a Primary Care center.

**Conclusions:** 1) attendance at kindergarten is associated with increased probability of being HF in Emergency departments and Paediatrics Primary Care services; 2) the HF children suffer more respiratory and infectious diseases, which are not explained by their attendance at a nursery, y 3) the above carries a higher drug consumption.

### Key words:

- Pediatrics
- Overuse
- Primary health care
- Morbidity
- Child day care centers

### Resumen

**Introducción:** las guarderías surgen para atender una necesidad social, pero no están exentas de influir sobre la salud infantil.

**Pacientes y métodos:** estudio longitudinal prospectivo de dos cohortes de niños entre 0 y 24 meses (se diferencian en asistencia o no a guardería) que acuden a las consultas de 33 pediatras del Servicio Público de Salud del Principado de Asturias. Los datos se obtuvieron de la historia clínica informatizada y entrevistas programadas (6, 12, 18 y 24 meses). Se compararon: número medio de visitas a Servicios de Urgencias y Pediatría e influencia de diferentes variables recogidas. Se analizaron: la morbilidad registrada (infecciones agudas y sibilancias recurrentes) entre hiperfrecuentadores (HF) y no HF.

**Resultados:** el número medio de visitas a las consultas pediátricas es significativamente mayor para los niños que acuden a guardería en todos los tramos de edad estudiados. Hay mayor porcentaje de HF entre los que acuden a guardería: los niños de entre 0 y 6 meses que acuden tienen un riesgo relativo de ser HF a Servicios de Urgencias de hasta seis veces mayor que los que no acuden y cuatro veces mayor de ser HF en las consultas de Pediatría.

**Conclusiones:** 1) la asistencia a guardería se asocia con mayor probabilidad de ser HF en Urgencias y en la consulta de Pediatría de Atención Primaria (AP); 2) los niños HF padecen más enfermedades respiratorias e infecciosas, que no son explicadas por su asistencia a guardería, y 3) lo anterior conlleva un mayor consumo de fármacos.

### Palabras clave:

- Pediatría
- Utilización de recursos sanitarios
- Atención Primaria
- Morbilidad
- Escuelas infantiles

**How to cite this article:** Ordóñez Alonso MA, Domínguez Aurrecochea B, Pérez Candás JI, López Vilar P, Fernández Francés M, Coto Fuente M, *et al.* Influencia de la asistencia a guarderías en la frecuentación en Urgencias y Atención Primaria. *Rev Pediatr Aten Primaria.* 2016;18:243-52.

## INTRODUCTION

In 1956, the World Health Organization (WHO) defined day care as “an organized service for the care of children away from their own homes during some part of the day, when circumstances call for normal care in the home to be supplemented”.<sup>1</sup>

In Spain, based on population surveys conducted in 2010, 25.01% of women work outside the home and use specialized child-care services.<sup>2</sup>

Day-care centre attendance is not free from risks to the health of the child,<sup>3,4</sup> and is associated with a considerable increase in the incidence of acute infections during childhood. A higher frequency of acute diseases involves an increased use of health care resources and medication. Thrane et al<sup>5</sup> showed that the risk of undergoing treatment with antibiotics doubles during the first three months of day care attendance.

The increased incidence of infectious diseases also has an impact on society, as these diseases are transmitted to close contacts in the household.<sup>6,7</sup>

All of the above may result in an increased use of health care services, which is already high in the under-five population,<sup>8</sup> and, considering that there are studies that have shown that past health care use is the best predictor for future health care use,<sup>9</sup> it would be possible for inadequate use patterns to develop during childhood that would be maintained in adulthood.

Thus, we are facing a reality that has a considerable influence on the everyday health of children and on present and future health care expenditures (as it can lead to a higher risk of iatrogenic injury in children and produce strain on the public health system due to increased use of health care resources).

The aim of this study was to analyse the impact of day-care centre attendance on the demand for medical services and the development of patterns of frequent attendance. We also analysed the morbidity pattern (acute infectious disease and recurrent wheezing) of children that were frequent attenders (FAs).

## OBJECTIVES

- To establish a statistical definition of patterns of frequent attendance in emergency departments and paediatric primary care (PPC) clinics.
- To establish the influence of the factors analysed in relation to frequent attendance:
  - Child-related: sex, gestational age, birth weight, neonatal disease and vaccination history.
  - Nutrition-related: breastfeeding and duration of breastfeeding.
  - Related to parents and socioeconomic status: number of siblings; and, for both parents, age, educational attainment and employment.
- To assess whether the “day care exposure” factor is associated with changes in health care use compared to previous use, and promotes overuse of health care services.
- To determine whether the pattern of morbidity is different in FAs.

## SAMPLE AND METHODS

We conducted a longitudinal prospective study of two cohorts of children aged 0 to 24 months that differed solely on attending vs not attending day-care centres (exposure factor).

**Participants:** the study started with the participation of 35 paediatricians and 20 nurses employed in the eight health areas of the Public Health Service of the Principality of Asturias (Servicio Público de Salud del Principado de Asturias [SESPA]), who enrolled 1139 children in the study.

**Inclusion criteria:** children born between January 1 and September 30, 2010 that receive routine care in the PPC clinics of the SESPA and whose families consented to their participation after being thoroughly informed. **Exclusion criteria:** presence of respiratory or cardiovascular disease or severe immunodeficiency.

## Study variables

**Independent variable:** day-care attendance (yes/no dichotomous variable), used to define the two cohorts. We documented the age (in months) at which attendance started, and the reasons for attendance.

### Subject variables:

- Personal characteristics: code, date of birth, sex, gestational age, birth weight, history of neonatal disease, breastfeeding, immunization history including routine immunizations in the Autonomous Community of Asturias and elective immunizations (pneumococcal, rotavirus and varicella vaccines).
- Family characteristics: number of siblings; maternal and paternal age, educational attainment, employment status, smoking, history of allergies and asthma.

### Dependent variables:

- Number and type of acute infections leading to a health care visit (to PC or ED services): bacteraemia, bronchiolitis, acute bronchitis, conjunctivitis, exanthematous viral diseases, pharyngitis, pharyngotonsillitis, influenza, laryngitis, meningitis, pneumonia, acute otitis media, common cold, sepsis, recurrent wheezing episodes as defined in the *Nelson Textbook of Pediatrics*.
- Visits to Emergency and Paediatrics departments: we included all visits, even if they all corresponded to a single disease process. We excluded routine visits made in the context of the well-child programme.
- Drugs used: antibiotics, bronchodilators, inhaled and oral corticosteroids and montelukast.

## Data collection

We collected the data from the electronic health records and through interviews with the parents at the PPC clinics scheduled at ages 6, 12, 18 and 24 months. Data for subject variables were collected during the first visit and outcome variables were collected during the visits at 6, 12, 18 and 24

months and documented in forms designed for that purpose. The informed consent signed by parents included an explicit statement on the adherence and compliance with legal and ethical principles.

## Statistical analysis

We performed a descriptive analysis, calculating the frequency distribution for qualitative variables and measures such as the mean, median and standard deviation (SD) for quantitative variables. We used Pearson's chi square test for comparison of two qualitative variables, calculating the relative risk and the 95% confidence interval (CI) when the association was statistically significant ( $P < .05$ ). We used Student's or Welch's t test to compare two means, and the Kruskal-Wallis test to compare more than two means. We assessed the normality of the distributions and differences in variance by means of the Shapiro-Wilk test and the Ansary-Bradley test, respectively. The statistical analysis was performed with the R<sup>®</sup> software (R Development Core Team, 2012) version 2.15.

## RESULTS

We collected data for 1139 children at 6 months, 1092 at 12 months, and finally 975 at 24 months. The 14.3% of loss to followup was due to employment changes in three paediatricians (7.9%) and residence changes in children included in the sample (7.4%).

Homogeneity of the cohorts under study: both cohorts were homogeneous, except for parental educational attainment and maternal employment (parental college-level education and maternal employment outside the home were more frequent in the cohort that attended day care).

Pneumococcal and rotavirus vaccine coverage was higher in children that attended day-care centres.

Children that attended day care: 43.7% of the children in the study were enrolled in day care at age 2 years (most started attending at age 5 to 6 months). Parental employment was the reason for enrolment in day care in 90.7% of these children.

**Number of visits to emergency or PPC services a month in both cohorts (Table 1):**

- The number of visits per month was lower in children that did not attend day care compared to those that did ( $P < .05$ ), regardless of the age at which day care attendance started. It is important to keep in mind that our study only analysed visits made due to infectious diseases or recurrent wheezing.
- To learn whether the “day care attendance” variable was associated with changes in the use of health care services, we analysed use by age bands to see whether enrolment in day care correlated to changes in the mean number of medical visits per month, and we found significant differences in all cases (Table 2).

**Definition of frequent attenders**

We defined FAs as children with a total number of visits in the two years under study that exceeded the mean plus two standard deviations (SDs). Emergency department FAs: the mean number of visits in the first two years of life was 2.69 with a SD of 2.99 (Table 3). Therefore, to be defined as FAs,

children had to have made more than 8.67 visits in the first two years of life (5.03% of the total children under study) (Table 4).

Paediatrics primary care FAs: the mean number of visits in the first two years of life was 14.56 with a SD of 10.08 (Table 3). To be defined as FAs, children had to have made more than 34.72 visits in the first two years of life (4.10% of the total children in the study) (Table 4).

The group of children that started attending day care at earlier ages (between 0 and 6 months) had a higher percentage of FAs for both types of setting (Table 5), with a relative risk (RR) of frequent use of emergency services up to six times that of children that did not attend day care, and a RR of frequent use of PPC services that was four times that of children that did not attend day care.

**Analysis of morbidity in children that were frequent attenders by number of episodes of disease**

When we analysed the mean number of episodes of infectious disease in FAs compared to non-FAs, we found that most FAs did not only seek medical

**Table 1. Mean number of emergency department (ED) and paediatrics primary care (PPC) visits per month**

Mean number visits/month	No day care	Start before 6 months	Start between 6 and 11 months	Start between 12 and 17 months	Start after 18 months	P value (K-W)
ED	0.09	0.19	0.14	0.12	0.13	0
PPC	0.53	0.74	0.75	0.69	0.67	0

**Table 2. Mean number of visits to the emergency department (ED) and to the primary care paediatrician before and after starting day care attendance for different age bands**

	Mean number visits/month ED			Mean number visits/month Primary Care paediatrician		
	Before starting day care	After starting day care	P	Before starting day care	After starting day care	P
6–11 months	0.09	0.16	.000	0.27	1.24	.000
12–17 months	0.09	0.15	.000	0.55	0.83	.000
18–24 months	0.03	0.49	.000	0.57	0.96	.000

**Table 3. Definition of frequent attendance for emergency services and paediatrics primary care**

	Emergency services	Paediatrics Primary Care
Mean visits/year	2.69	14.56
Standard deviation	2.99	10.08
Definition of FA (based on the total visits for the two years)	> 8.67	> 34.72

FA: frequent attender.

**Table 4.** Emergency department and primary care paediatrics frequent attenders as absolute frequency and percentage, by attendance to day care and age of initial day care enrolment

	Emergency FA		PPC FA	
	Number	%	Number	%
No day care	15	2.73%	14	2.55%
0–6 months	12	16.67%	8	11.11%
6–11 months	6	5.50%	6	5.50%
12–17 months	8	5.88%	8	5.88%
18–24 months	8	7.34%	4	3.67%
Total	49	5.03%	40	4.10%

FA: frequent attender; PPC: Paediatrics Primary Care.

**Table 5.** Relative risk of being a frequent attender based on day care attendance by age band

	Emergency FA RR (95% CI)	PPC FA RR (95% CI)
No day care	Control category	Control category
Start at 0–6 months	6.1 (2.97-12.51)	4.36 (1.89-10.02)
Start at 6–11 months	2.01 (0.79-5.08)	2.16 (0.85-5.49)
Start at 12–17 months	2.15 (0.93-4.97)	2.31 (0.98-5.38)
Start after 18 months	2.69 (1.17-6.18)	1.44 (0.48- 4.29)

CI: confidence interval; FA: frequent attender; PPC: Paediatrics Primary Care; RR: relative risk.

care more often, but also had a higher number of episodes of the most prevalent diseases under study (bronchiolitis, bronchitis, conjunctivitis, gastroenteritis, otitis media, common cold, recurrent wheezing and sinusitis) (Table 6).

When we analysed the morbidity of FAs, we observed that day care attendance was not associated with statistically significant differences in morbidity (Table 7).

**Table 6.** Mean number of episodes of the different diseases in emergency department and paediatrics primary care clinic frequent attenders and non-frequent attenders

	Emergency department			PPC		
	FA	Non-FA	P	FA	Non-FA	P
Bronchiolitis	0.73	0.4	0	0.82	0.4	.01
Bronchitis	1.18	0.6	.01	1.6	0.59	0
Conjunctivitis	1.1	0.61	.01	1.85	0.58	0
Exanthematous viral infection	0.71	0.46	.06	0.72	0.46	.09
Viral pharyngitis	0.88	0.51	.03	0.95	0.51	.02
Pharyngotonsillitis	0.41	0.25	.23	0.32	0.25	.47
Gastroenteritis	1.37	0.79	.02	1.75	0.78	0
Influenza	0.33	0.11	.04	0.2	0.11	.26
Laryngitis	0.65	0.34	.06	0.55	0.35	.16
Pneumonia	0.14	0.06	.15	0.1	0.06	.42
Otitis media	1.51	0.68	.01	2.08	0.67	0
Common cold	7.31	3.66	0	8.47	3.65	0
Recurrent wheezing	1.59	0.36	0	1.8	0.36	0
Sinusitis	0.14	0.21	.35	1.12	0.16	.04
Viral disease	0.29	0.07	.01	0.17	0.07	.32

FA: frequent attenders; PPC: Paediatrics Primary Care; RR: relative risk.

**Table 7. Mean number of episodes of the different diseases in emergency department and primary care clinic frequent attenders by day care attendance**

	Emergency department FA			PPC FA		
	Attends day care	Does not attend day care	P	Attends day care	Does not attend day care	P
Bronchiolitis	0.74	0.71	.87	0.86	0.75	.97
Bronchitis	1.17	1.21	.97	1.39	2.08	.15
Conjunctivitis	1.37	0.43	.02	1.89	1.75	.89
Exanthematous viral infection	0.71	0.71	.99	0.71	0.75	.91
Viral pharyngitis	0.97	0.64	.26	0.93	1	.6
Pharyngotonsillitis	0.43	0.36	.86	0.33	0.32	.99
Gastroenteritis	1.46	1.14	.94	1.38	1.92	.47
Influenza	0.26	0.5	.72	0.21	0.17	.41
Laryngitis	0.8	0.29	.22	0.54	0.58	.46
Pneumonia	0.14	0.14	.99	0.11	0.08	.84
Otitis media	1.97	0.36	.01	2.39	1.33	.06
Common cold	7.63	6.5	.76	8.64	8.08	.71
Recurrent wheezing	1.37	2.14	.18	1.79	1.83	.68
Sinusitis	0.11	0.21	.74	1.11	1.17	.23

FA: frequent attender; PPC: Paediatrics Primary Care.

### Study of medication use by frequent attenders

A higher percentage of FAs compared to non-FAs were treated with oral and inhaled bronchodilators, oral and inhaled corticosteroids, montelukast and antibiotics ( $P < .05$ ) (Table 8).

### DISCUSSION

We conducted a prospective study designed by the research group of the Spanish Association of Primary Care Paediatrics (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria [AEPap])<sup>10</sup> and adapted for the Autonomous Community of Asturias

**Table 8. Comparison of medication use in frequent attenders and non-frequent attenders**

	Emergency department			Paediatrics Primary Care		
	FA	Non-FA	P	FA	Non-FA	P
Mean number of courses of antibiotic treatment used	2.1	4.69	< .01	2.1	5.35	< .01
Percentage that used oral corticosteroids in the 24-month period	31.10%	61.22%	< .01	31.12%	67.50%	< .01
Mean number of courses of oral corticosteroids in the past 24 months	0.52	1.53	< .01	0.52	1.91	< .01
Percentage that used inhaled corticosteroids in the 24-month period	11.23%	24.49%	.01	10.80%	37.50%	< .01
Percentage that used oral bronchodilators in the 24-month period	31.97%	46.94%	.04	31.12%	70.00%	< .01
Percentage that used inhaled bronchodilators in the 24-month period	29.16%	63.27%	< .01	29.20%	70.00%	< .01
Percentage that used montelukast in the 24-month period	8.86%	22.45%	< .01	8.86%	22.45%	< .01

FA: frequent attender; PPC: Paediatrics Primary Care.



by the Association of Primary Care Paediatrics of Asturias (Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria [AAPap]): *Infectious disease and health care resource use in children aged less than 2 years that attend day care centres*.<sup>11</sup> The universe of the study was the PPC clinics of the public health system that routinely serve between 90% and 95% of the paediatric population.<sup>12</sup>

The work was performed on a voluntary basis by 33 paediatricians and 20 nurses, which unquestionably improved data collection but did not allow for random sampling. The study was coordinated by the research group, which collected and reviewed the surveys before submitting them to the statistics team. The data were gathered during routine visits in an attempt to optimise the research capabilities of PPC teams.

The considerable number of paediatricians that participated allowed us to obtain a large sample, but also carried limitations, chief of which was the potential variability in diagnostic criteria. We tried to minimize this bias by predefining the diseases documented in the study.

Another limitation is that the study only took into account visits due to infectious diseases or episodes of recurrent wheezing, a potentially severe disease with a high prevalence in Asturias (45.6% of children experience at least one episode of wheezing in the first 36 months of life).<sup>12</sup>

Each episode that led to a health care visit and a specific diagnosis was documented only once, even if children made more than one visit in the context of a single disease process.

All visits to paediatric primary care and emergency services were documented, even if more than one visit was made for a single episode of disease.

We did not take into account the characteristics of day care centres or the time children spent in them, but in a study of similar characteristics, Lafuente et al<sup>13</sup> did not find differences in morbidity based on the number of hours spent in day care or the staff-to-child ratio of the different centres.

Although the initial sample included 1139 children, the final sample consisted of 975 (73% of the

total children born during the period and that received care in the health facilities under study).

Of the total population under study, 43.7% of children attended day care, a figure that approximated the one published in “Estadística de las enseñanzas no universitarias con 51,8 % de niños escolarizados a los dos años” (Statistics of pre-school, primary and secondary education, with 51.8% of children attending educational facilities by age two years).<sup>14</sup>

The mean number of visits to Paediatrics Services (emergency and primary care) per month was higher in children that attended day care and increased significantly when children started attending at an early age. These trends have also been observed in studies conducted in other autonomous communities in Spain.<sup>15,16</sup>

The development of the first episodes of infectious disease is displaced to earlier ages, when there is a greater risk of complications requiring medical attention.<sup>17</sup>

In our study, the mean number of visits per month to emergency or PPC services by age band (7 to 11 months, 12 to 18 months, and older than 18 months) increased after initial enrolment in day care ( $P = .000$  in all categories). We must take into account that we could not analyse the group of infants aged less than 6 months because we did not have any data for the period preceding day care enrolment.

Although high-frequency use in paediatric age groups is a well-known phenomenon, few studies have been devoted to it.

Defining the number of visits required to categorise a patient as a FA is challenging, and we did not find consistent criteria in the medical literature we reviewed.

The Croatian National Institute of Health<sup>18</sup> considered children to be FAs if the number of visits exceeded the 75<sup>th</sup> percentile (more than ten visits a year for a single child). In 2011, Melissa Klein et al set the cut-off point at more than two SD (nine or more visits in one year).<sup>19</sup> Considering that these studies have been conducted in other countries

and that the pattern of use of health care services may be influenced by a wide range of factors (personal factors in patients, sociodemographic factors, family or social support factors, and factors specifically related to the health care system [paediatric services versus general medicine at the primary care level, availability and accessibility]), the results of other studies can be used for guidance, but not for comparison.

Studies conducted in Spain have found a prevalence of frequent attendance, defined as the mean plus one SD, of 14.89%, but the age range under study was 0 to 14 years and the duration of followup three months.<sup>20</sup> If we apply the same definition to another study conducted in 2012 in the primary care setting with a followup of 12 months, the data show that in children aged less than 1 year, FAs would be those that made more than nine visits a year, and in children aged 1 to 2 years, children that made more than 12 visits. The overall percentage of FAs would be 11.86%.<sup>21</sup> This study took into account all on-demand appointments and had a significantly smaller sample than our study.

In our study, which analysed visits to emergency services and to PPC clinics separately and had a followup period of two years, FAs in paediatric services corresponded to children that made more than 34.72 visits in the two-year period.

The only factor under study for which we found a significant association with frequent use of services was day care attendance, and this association was stronger in children that started attending day care before age 6 months (RR FA use, 6 for the emergency department and 4.36 for PPC clinics). There are previous studies that support this association.<sup>17</sup>

All of the above results in an increased use of health care resources by children that attend day-care centres, not only due to the number of parental work-loss days,<sup>22</sup> but also to the increased use of antibiotics,<sup>13,23,24</sup> as up to 80% of visits by infants aged up to 12 months resulted in antibiotic treatment.<sup>25</sup>

We found that the RR of using medication (antibiotics, oral and inhaled bronchodilators, oral and

inhaled corticosteroids or montelukast) was higher in children that started attending day care earlier. When we analysed FAs separately (regardless of whether they did or did not attend day care) we found an overall higher use of medication ( $P < .05$ ).

The term “frequent attender” usually carries negative connotations, so we also set out to determine whether this term could be misleadingly applied to a subset of the children that we serve that have a high-risk immunologic profile (a predisposing factor) and in whom this scheme of care (day care) could act as a trigger, given that day care attendance is associated with an increased incidence of these diseases as well as recurrent wheezing.

Although the total number of FAs in our study was small—which is explained by the fact that the study was not originally designed to analyse this variable—we compared the number and type of infectious diseases in FAs that attend day care versus FAs that do not, and found no statistically significant differences. Therefore, FAs, whether they attend day care or not, are children that on average experience a significantly higher number of episodes of nearly every infectious disease analysed in the study and of recurrent wheezing. This also seems to support the hypothesis of children that are FAs having a specific immunologic profile.

## CONCLUSIONS

- Day care attendance is associated with a higher probability of frequent health care use (of emergency departments or PPC clinics).
- Children that were FAs had respiratory and infectious diseases more frequently, and this increased incidence was accounted for by day care attendance.
- This increased incidence of disease probably results in an increased use of medication (antibiotics, oral and inhaled bronchodilators, oral and inhaled corticosteroids and montelukast).
- The increased incidence of respiratory and infectious disease in all FA use groups suggests that these could be subject to further research.

## CONFLICTS OF INTEREST

The authors have no conflicts of interest to declare in relation to the preparation and publication of this article.

This study has been funded by the Office Health Biology Research of the Principality of Asturias, record number AP10-11, ruling of June 2010. The study received no other funding.

## ABBREVIATIONS

**AAPap:** Asociación Asturiana de Pediatría de Atención Primaria (Primary Care Paediatrics Association of Asturias) • **AEPap:** Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (Spanish Association of Primary Care Paediatrics) • **CI:** confidence interval • **FA:** frequent attender • **PC:** primary care • **PPC:** Paediatrics Primary Care • **RR:** relative risk • **SD:** standard deviation • **SESPA:** Servicio Público de Salud del Principado de Asturias (Public Health Service of the Principality of Asturias) • **WHO:** World Health Organization.

## ACKNOWLEDGMENTS

**MORBIGUARD research group:** Aide Aladro Antuna, Ana María Pérez López, Begoña Domínguez Aurrecochea, Encarnación Díez Estrada, Francisco J. Fernández López, José I. Pérez Candas, Leonor Merino Ramos, María Fernández Francés,

María Ángeles Ordóñez Alonso, Purificación López Vilar, So-  
nia Ballesteros García, Mar Coto Fuente.

**Collaborating group:** Isabel González-Posada Gómez, Sonia Alonso Álvarez, María Agustina Alonso Álvarez, Diana Solís, Josefina Collao Alonso, Margot Morán Gutiérrez, Ángel Costales-Gloria Peláez, Mónica Cudeiro Álvarez, Beatriz Fernández López, María Pilar Flórez Rodríguez, Cruz Andrés Álvarez, Isolina Patallo Arias, Mónica Fernández Inestal, Ana Pérez Vaquero, Carmen Díaz Fernández, Silvia Ruisánchez Díez, Antonia Sordo, María Antonia Castillo, Lidia González Guerra, Águeda García Merino, Teresa García, María Teresa Canon del Cueto, Laura Tascón Delgado, Isabel Tamargo Fernández, Laura Lagunilla Herrero, Susana Concepción Polo Mellado, Cruz Bustamante Perlado, Susana Parrondo, Nevada Juanes Cuervo, Ana Arranz Velasco, Belén Aguirrezabalaga González, Mario Gutiérrez Fernández, Isabel Mora Gandarillas, Rosa María Rodríguez Posada, Isabel Fernández Álvarez-Cascos, Isabel Carballo Castillo, Felipe González Rodríguez, Tatiana Álvarez González, Zoa Albina García Amorín, Monserrat Fernández Revilla, Fernando Nuno Martín. Susana Concepción Polo Mellado, Cruz Bustamante Perlado, Susana Parrondo, Nevada Juanes Cuervo, Ana Arranz Velasco, Belén Aguirrezabalaga González, Mario Gutiérrez Fernández, Isabel Mora Gandarillas, Rosa M.<sup>a</sup> Rodríguez Posada, Isabel Fernández Álvarez-Cascos, Isabel Carballo Castillo, Felipe González Rodríguez, Tatiana Álvarez González, Zoa Albina García Amorín, Monserrat Fernández Revilla, Fernando Nuno Martín.

## REFERENCES

1. La asistencia al niño en las guarderías y residencias infantiles. Informe técnico n.º 256. In: Organización Mundial de la Salud [online] [consulted on 14/09/2016]. Available in <http://apps.who.int/iris/handle/10665/37485>
2. Encuesta de población activa. Módulo de conciliación entre la vida laboral y familiar. In: Instituto Nacional de Estadística [online] [consulted on 14/09/2016]. Available in [www.ine.es/prensa/np417.pdf](http://www.ine.es/prensa/np417.pdf)
3. Enserink R, Ypma R, Donker GA, Smit HA, Van Pelt W. Infectious disease burden related to child day care in the Netherlands. *Pediatr Infect Dis J.* 2013;32:e334-40.
4. Ochoa Sangrador C, Barajas Sánchez MV, Muñoz Martín B. Relación entre la asistencia a guarderías y enfermedades infecciosas agudas en la infancia. Una revisión sistemática. *Rev Esp Salud Pública.* 2007;81:113-29.
5. Thrane N, Olesen C, Md JT, Søndergaard C, Schønheyder HC, Sørensen HT. Influence of day care attendance on the use of systemic antibiotics in 0 to 2 years old children. *Pediatrics.* 2001;107:e76.
6. Marshall BC, Adler SP. The frequency of pregnancy and exposure to cytomegalovirus infections among women with a young child in day care. *Am J Obstet Gynecol.* 2009;200:163.e1-5.
7. Hedin K, Andre M, Mölsted S, Rodhe N, Petersson C. Infections in families with small children: use of social insurance and healthcare. *Scand J Prim Health Care.* 2006;24:98-103.
8. Oterino de la Fuente D, Peiró Moreno S. Utilización de los servicios de urgencias hospitalarios por niños menores de dos años. *An Pediatr (Barc).* 2003;58:23-8.
9. Janicke DM., Finney JW, Riley AW. Children's health care use. A prospective investigation of factors related to care-seeking. *Med Care.* 2001;39:990-1001.
10. Del Castillo Aguas G, Gallego Iborra A, Ledesma Albarrán JM, Gutiérrez Olid M, Moreno Muñoz G,

- Sánchez Tallón R. Influencia de la asistencia a las guarderías sobre la morbilidad y el consumo de recursos sanitarios en niños menores de dos años. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2009;11:695-708.
11. Domínguez Aurrecochea B, Fernández Francés M, Ordóñez Alonso MA, López Vilar P, Pérez Candás JJ, Merino Ramos L, et al. Patología infecciosa y consumo de recursos sanitarios en menores de 2 años que acuden a guarderías. *An Pediatr (Barc)*. 2015;83:149-59.
  12. Actividad ordinaria en centros de Atención Primaria Informe resumen evolutivo del sistema nacional de salud 2007-2009. In: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad [online] [consulted on 14/09/2016]. Available in <http://goo.gl/iKebiP>
  13. Cano Garcinuño A, Mora Gandarillas I, Grupo SLAM. Patrones de evolución temporal de las sibilancias en el lactante. *Bol Pediatr*. 2012;52:86-7.
  14. Lafuente Mesanza P, Lizarraga Azparren MA, Ojembarrena Martínez E, Gorostiza Garay E, Hernaiz Barandiarán JR. Escolarización precoz e incidencia de enfermedades infecciosas en niños menores de 3 años. *An Pediatr (Barc)*. 2008;68:30-8.
  15. Estadística de las enseñanzas no universitarias. Curso 2012-2013. In: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Estadística y Estudios [online] [consulted on 14/09/2016]. Available in <http://goo.gl/i3ioPx>
  16. Gorrotxategi Gorrotxategi P, Aseguinolaza Iparraguirre I, Sarrionandia Uribelarrea MJ, di Michele Russo A, Reguilón Miguel MJ, Caracho Arbaiza MR, et al. La asistencia a la guardería aumenta no solo la morbilidad, sino también el uso de recursos sanitarios. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2013; 15:177-9.
  17. Enserink R, Ypma R, Donker G A, Smit HA, van Pelt W. Infectious disease burden related to child day care in the Netherlands. *Pediatr Infect Dis J*. 2013;32:e334-40.
  18. Stojanović-Špehar S, Blažeković-Milaković S, Bergman-Marković B, Matijašević I. Preschool children as frequent attenders in Primary Health Care in Croatia: retrospective study. *Croat Med J*. 2007;48: 852-9.
  19. Klein M, Vaughn LM, Baker RC, Taylor T. Welcome back? Frequent attenders to a pediatric primary care center. *J Child Health Care*. 2011;15:175-86.
  20. Tapia Collados C, Gil Guillén V, Orozco Beltrán D, Bernáldez Torralba C, Ortuño Adán E. Hiperfrecuentación en las consultas de Pediatría de Atención Primaria. *Rev Pediatr Aten Primaria*. 2004; 6:547-57.
  21. Parrilla Roue M, Palma Barrio RM, Bailón López RM, Fanego Fernández A, Santisteban Robles M. Hiperfrecuentación pediátrica en dos centros de salud urbanos. Comunicación oral. Congreso SEPEAP 2013. In: *Pediatría en Atención Primaria* [online] [consulted on 14/09/2016]. Available in <http://goo.gl/U0eQir>
  22. Churchil R, Pickering L. Infection control challenges in child-care center. *Infect Dis Clin North Am*. 1997; 2:347-63.
  23. Nordlie AL, Andersen BM. Changes in antibiotic consumption among day-care children in Oslo. *Tidsskr Nor Laegeforen*. 2007;127:2924-6.
  24. Thrane N, Olesen C, Søndergaard C, Schønheyder HC, Sørensen HT. Influence of day care attendance on the use of systemic antibiotics in 0- to 2-year-old children. *Pediatrics*. 2001;107:e76.
  25. Nordlie AL, Andersen BM. Children in day care centers: infections and use of antibiotics. *Tidsskr Nor Laegeforen*. 2002;122:2707-10.