



Publicado en Internet:
16-mayo-2024

María Conde-Pumpido Velasco:
maria.conde.pumpido@gmail.com

Caso clínico. Dermatología

Picadura de insecto: patología trivial hasta que se complica

María Conde-Pumpido Velasco^a, Ana Hercberg Moreno^a, Laura Saniger Rodríguez^a,
Alicia Álvaro Gómez^a, Diego Bautista Lozano^b, Andrés Alcaraz Romero^b

^aMIR-Pediatría. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España

^bServicio de Pediatría. Hospital Universitario de Getafe. Madrid. España.

INTRODUCCIÓN

La picadura por insectos suele ser una patología benigna y con resolución espontánea en la mayoría de los casos, pero en ocasiones puede tener una evolución complicada.

RESUMEN DEL CASO

Adolescente de 13 años que acude a Urgencias derivado por su pediatra de Atención Primaria por lesión en primer dedo de mano izquierda de una semana de evolución. El paciente refiere posible picadura en República Dominicana hace 10 días, sin saber especificar el causante concreto. Afebril en todo momento, sin otra sintomatología acompañante.

A la exploración destaca inflamación en matriz ungueal del primer dedo de la mano izquierda, con contenido purulento, que se acompaña de lesión violácea, dolorosa a la palpación, en pulpejo del mismo dedo (**Figura 1**). No claro aumento de temperatura local ni otra coloración. No alteraciones de la sensibilidad. Se solicita radiografía de dicho dedo, donde no se aprecian lesiones óseas agudas.

Valorado por Cirugía Plástica, decidiendo en conjunto alta con antibioterapia oral con amoxicilina-clavulánico. Control clínico a las 24 horas, sin cambios respecto a primera exploración, añadiendo tratamiento tópico con mupirocina.

Nuevo control a los 3 días, objetivando placa necrótica de 0,5 cm de diámetro, intuyendo material purulento debajo de la misma, con persistencia de la paroniquia vista el primer día. Se realiza drenaje de las regiones abscesificadas con salida de material purulento y se recoge muestra para cultivo (resultado negativo posterior).

Se mantienen antibioterapia oral y tópica junto con curas diarias durante 10 días, siendo reevaluado por Cirugía Plástica tras finalizar el tratamiento. Finalmente, en el último control no se apreciaban lesiones en el dedo, estando completamente epitelizado, por lo que se dio de alta por la completa resolución de la lesión.

CONCLUSIONES

- Las picaduras de insectos, aunque inicialmente sean comunes, pueden complicarse.
- Cuando esto ocurre hay que seguir un seguimiento estrecho, con vigilancia de los signos y síntomas de alarma.
- La antibioterapia oral y tópica en ocasiones es insuficiente para el tratamiento de picaduras sobreinfectadas.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.

RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES

Los autores han remitido un formulario de consentimiento de los padres/tutores para publicar información de su hijo/a.

Figura 1. Inflamación en matriz ungueal del primer dedo de la mano izquierda, con contenido purulento y lesión violácea



Cómo citar este artículo: Conde-Pumpido Velasco M, Hercberg Moreno A, Saniger Rodríguez L, Álvaro Gómez A, Bautista Lozano D, Alcaraz Romero A. Picadura de insecto: patología trivial hasta que se complica. Rev Pediatr Aten Primaria Supl. 2024;(33):e21.