



Anexo 4. Respuestas correctas de los residentes de Pediatría al cuestionario adaptado		
Pregunta (N = 19 residentes)	n	Prevalencia (%)
1. La leche materna es el alimento de mejor calidad para el recién nacido, siempre que la madre no esté desnutrida (F)	3	15,8
2. Durante el segundo año de vida la leche materna es de muy baja calidad (F)	19	100
3. Si la madre está tomando amoxicilina-ácido clavulánico, se debe suspender la lactancia (F)	17	89,5
4. Cuando el recién nacido amamantado llora de hambre, se le debe complementar con biberón (F)	16	84,2
5. ¿Ha oído hablar de los Hospitales Amigos de los Niños? (Sí)	12	63,2
6. ¿Hasta qué edad se recomienda actualmente leche materna como único alimento? (6 meses)	19	100
7. ¿Qué debe recibir el recién nacido normal además de leche materna? (Nada)	19	100
8. ¿Cuál es la interpretación científica de la comúnmente denominada "leche aguada"? (Leche de inicio de cada mamada)	2	10,5
9. La cantidad de leche que una mujer es capaz de producir depende de: (La frecuencia y vigor de las mamadas)	2	10,5
10. Indique cuál de estas prácticas institucionales favorece más la lactancia materna en la maternidad: (Puesta al pecho en la primera hora de vida)	19	100
11. Indique el recurso más accesible y eficaz para el cuidado de los pezones: (Correcta posición para amamantar)	17	89,5
12. La primera mamada debe ser inmediatamente después del parto (V)	15	79
13. El suero glucosado es necesario para evitar la hipoglucemia del recién nacido (F)	19	100
14. Dando el pecho con más frecuencia, disminuye el riesgo de ictericia (V)	14	73,7
15. Muchos niños necesitan biberón los primeros días hasta que a la madre le sube la leche (F)	16	84,2



16. Hay que dar el pecho cada vez que el bebé lo pida (V)	19	100
17. Los chupetes interfieren y dificultan la lactancia materna (V)	17	89,5
18. El recién nacido debe permanecer día y noche con la madre (V)	15	79
19. La primera toma debe ser al menos 3 horas después del parto (F)	14	73,7
20. En caso de mastitis hay que suprimir la lactancia (F)	18	94,7
21. Hay que lavar el pecho antes y después de cada toma (F)	15	79
22. No es recomendable dar el pecho si la madre es portadora de hepatitis B (F)	10	52,6
23. Si el niño tiene diarrea, hay que suspender unos días la lactancia (F)	19	100
24. En gemelos no se debe recomendar la lactancia materna (F)	18	94,7